

Kronična rana v predelu meč pri moškem s sladkorno boleznijo tipa 2

Retrospektivno dokumentiran potek pred in po uvedbi Smrekovit Klasik

Oznaka primera	CASE_009_2026
Fotografska dokumentacija	20 originalnih JPEG fotografij z ohranjenimi časovnimi žigi
Obdobje fotografij	31. 12. 2024 - 5. 4. 2025
Čas začetka uporabe	začetek februarja 2025; fotografiji 3. 2. 2025 označujeta časovno točko začetka

Glavna dokumentacijska posebnost primera: ohranjenih je več zaporednih fotografij še pred uvedbo Smrekovit Klasik. Na njih rana do konca januarja ne kaže jasnega trenda zapiranja; po časovni točki začetka uporabe v začetku februarja pa je v naslednjih tednih dokumentiran izrazit in kontinuiran vizualni premik.

Ta dokument opisuje posamezen opazovalni primer. Ne gre za klinično raziskavo in iz njega ni mogoče dokazati vzročne učinkovitosti izdelka ali rezultata posploševati na druge podobne rane.

1. Povzetek primera

Moški, rojen leta 1960, s sladkorno boleznijo tipa 2, zdravljeno s tabletami in brez inzulina, je opisal nastanek rane na zadnji strani desnega spodnjega dela noge v predelu mečne mišice po drgnjenju škornja med nabiranjem gob. Po rekonstrukciji časovnice je rana verjetno nastala približno oktobra 2024.

Po navedbah uporabnika je bila rana v naslednjih mesecih redno oskrbovana s strani patronažne službe z različnimi medicinskimi pripravki, vendar se ni zadovoljivo izboljševala. Konkretna imena predhodno uporabljenih pripravkov niso znana.

Ob skupnem pregledu originalne fotografske serije je uporabnik fotografiji z dne 3. 2. 2025 prepoznal kot čas začetka uporabe Smrekovit Klasik. Po njegovi navedbi ob tej spremembi ni bila uvedena druga nova terapija ali pomembna sprememba oskrbe; patronažna medicinska sestra je rano še naprej spremljala in lokalno oskrbovala.

2. Način dokumentiranja

Primer je bil rekonstruiran retrospektivno 7. 10. 2026 na podlagi osebnega pogovora in 20 originalnih fotografij, ki jih je posnel uporabnik sam. Datoteke vsebujejo ohranjene EXIF časovne žige od 31. 12. 2024 do 5. 4. 2025, ki se ujemajo s kronologijo imen datotek.

Pri ustnem spominu uporabnika je bilo ugotovljeno enoletno neskladje v letnicah. Za delovno časovnico so zato prednostno uporabljeni originalni fotografski časovni žigi. Fotografije niso bile standardizirane glede razdalje, kota, osvetlitve ali merilne lestvice, zato ne omogočajo natančnega izračuna površine rane.

3. Izhodišče in predhodna oskrba

Na prvem ohranjenem posnetku 31. 12. 2024 je rana že jasno prisotna. V januarju sledi več zaporednih fotografij, na katerih ostaja odprto področje z nepravilnimi robovi, svetlo-rumenkastimi do rumeno-rjavkastimi oblogami in pordelostjo okolne kože. V tej seriji do konca januarja ni vidnega jasnega trenda zapiranja.

4. Fotografski potek - obdobje pred uvedbo

Spodnje fotografije predstavljajo izbor iz enajstih ohranjenih posnetkov pred časovno točko začetka uporabe Smrekovit Klasik. Namen izbora je pokazati, da ne gre le za eno začetno fotografijo, temveč za večtedensko dokumentirano vztrajanje odprte rane.



31. 12. 2024
prvi ohranjeni posnetek

Odrpna rana z obsežno svetlo-rumenkasto oblogo in izrazitejšo rdečino okolne kože.



18. 1. 2025
vztrajanje odprte rane

Rana ostaja odprta; prisotne so rumenkaste obloge in pordelost okolice.



29. 1. 2025
tik pred februarско časovno prelomnico

Bližnji posnetek prikazuje vztrajajočo odprto rano z rumeno-rjavkastimi oblogami in pordelo okolico.

Do konca januarja je odprto področje na fotografijah še vedno jasno prisotno. Ker fotografije niso standardizirane, ni mogoče zanesljivo izmeriti površine ali globine, vendar vizualna serija ne kaže jasnega prehoda proti zaprtju.

5. Čas začetka uporabe in zgodnji fotografski premik

Med skupnim pregledom fotografij je uporabnik posnetka z dne 3. 2. 2025 prepoznal kot čas začetka uporabe Smrekovit Klasik. Ni mogoče ugotoviti, ali sta bila posnetka narejena tik pred prvim nanosom ali neposredno po njem, zato datum predstavlja časovno točko začetka in ne strogo definiran 'pred' posnetek.



3. 2. 2025
čas začetka uporabe Smrekovit Klasik

Rana je široko odprta, z obsežno svetlo-rumenkasto oblogo in izrazito pordelo okolico.



23. 2. 2025
približno 20 dni pozneje

Vidno je manj svetle obloge, več rožnato-rdeče površine ter manjše in na videz plitvejše odprto področje.

Primerjava 3. in 23. februarja predstavlja najbolj izrazit zgodnji vizualni premik v seriji. Gre za opis fotografskega poteka; iz fotografij samih ni mogoče določiti vzroka spremembe.

6. Nadaljnji potek



28. 2. 2025
približno 25 dni po časovni točki začetka

Odprta površina se nadalje zmanjšuje; prevladuje rožnato-rdeča površina, svetla obloga je omejena na manjši del.



20. 3. 2025
približno 45 dni pozneje

Ostaja manjša podolgovata površinska odprta sprememba; območje je vizualno bistveno manjše kot februarja.



5. 4. 2025
zaključni posnetek serije

Nekdanja rana je na fotografiji pretežno zaprta; ostajata manjši krastasti predel in blaga preostala rdečina.

Uporabnik je ob retrospektivnem pogovoru ocenil, da se je rana po uvedbi Smrekovit Klasik »v veliki meri zacelila v enem mesecu in pol«. Fotografska serija je s takšno časovno oceno skladna: 20. 3. je ostala le še manjša površinska sprememba, v začetku aprila pa je bilo področje pretežno zaprto.

7. Uporaba Smrekovit Klasik in sočasna oskrba

Ob začetku je uporabnik prejel običajna navodila za uporabo Smrekovit Klasik pri rani in je navedel, da jim je sledil. Po začetnem svetovanju primer ni bil aktivno voden na daljavo. Lokalno oskrbo in spremljanje je po njegovi navedbi nadaljevala patronažna medicinska sestra.

Natančen dejansko uporabljeni protokol prevez - vrsta gaze, količina mazila, pogostost prevez in porabljena količina - ni bil naknadno dokumentiran. Po navedbah uporabnika ob uvedbi Smrekovit Klasik ni bila uvedena druga nova terapija ali pomembna sprememba oskrbe.

8. Kaj primer kaže in česa ne kaže

Primer dokumentira večmesečno rano, več zaporednih fotografij pred uvedbo izdelka in nato časovno jasno serijo fotografij po začetku uporabe. Najpomembnejši signal je, da pred februarjem na ohranjeni seriji ni jasnega trenda zapiranja, med 3. in 23. februarjem pa se pojavi izrazit vizualni premik, ki se v naslednjih tednih nadaljuje.

Iz tega ni mogoče dokazati, da je Smrekovit Klasik samostojno povzročil zaprtje rane. Gre za posamezen retrospektivni opazovalni primer brez kontrolne skupine. Naravnega poteka, vpliva stalne patronažne oskrbe in drugih neizmerjenih dejavnikov ni mogoče izključiti.

9. Dokumentacija in omejitve

- 20 originalnih fotografij z ohranjenimi časovnimi žigi; fotografije niso bile standardizirane.
- Retrospektivni osebni pogovor 7. 10. 2026; pri letnicah je bila ugotovljena dokumentirana napaka spomina.
- Ni standardiziranih meritev površine ali globine rane in na fotografijah ni merilne lestvice.
- Predhodno uporabljeni medicinski pripravki in natančen protokol prevez niso znani.
- Ni laboratorijskih podatkov o HbA1c ali objektivne žilne diagnostike.
- Ni pridobljene neodvisne dokumentacije patronažne službe ali zdravnika.

10. Sklep

CASE_009_2026 je dobro fotografsko dokumentiran retrospektivni opazovalni primer dolgotrajne travmatsko nastale rane v predelu meč pri osebi s sladkorno boleznijo tipa 2. Po večmesečnem neugodnem poteku je bila v začetku februarja 2025 uvedena uporaba Smrekovit Klasik. V naslednjih tednih je na serijskih fotografijah dokumentiran izrazit in progresiven trend zapiranja, pri čemer je bila približno 45 dni po začetni časovni točki rana že skoraj zaprta, do začetka aprila pa pretežno zaprta.

Izjava o transparentnosti. Dokument je pripravil Smrekovit na podlagi gradiva, ki ga je posredoval uporabnik. Smrekovit Klasik je izdelek proizvajalca Smrekovit. Avtor oziroma pripravljavec poročila je povezan s proizvajalcem, kar predstavlja potencialni konflikt interesov in možen vir interpretacijske pristranskosti.

Dokument je namenjen predstavitvi dokumentiranega posameznega primera in ne nadomešča zdravstvenega pregleda, diagnoze ali zdravljenja.